


Утверждаю:  
Председатель методической  
комиссии по профилю  
«Математика»  
 В.Н. Деснянский  
«28» кабрия 2022 г.

**ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА  
ШКОЛЬНИКОВ «ПАРУСА НАДЕЖДЫ»  
ПО ПРОФИЛЮ «МАТЕМАТИКА»  
2022-2023 УЧ. ГОД  
Заключительный этап  
11 класс**

**Вариант 1**

**Задание 1.**

Два всадника выезжают одновременно навстречу друг другу из пункта А в пункт В и из пункта В в пункт А. После встречи один прибывает в пункт В через 27 минут, другой в пункт А через 12 минут. За сколько минут проехал каждый всадник путь АВ?

**Задание 2.**

Разложите на множители:

$$x^5 + x + 1.$$

**Задание 3.**

Известно, что уравнение  $x^5 - 5x^4 + ax^3 + bx^2 + cx - 1 = 0$  имеет 5 положительных корней. Найдите числа а, b, с.

**Задание 4.**

Сравните два числа:

$$\sqrt{10 + \sqrt{24} + \sqrt{40} + \sqrt{60}} \text{ и } 5,4$$

Ответ обоснуйте.

**Задание 5.**

Решите в целых числах систему:

$$\begin{cases} z^2 + yx - yz - zx = 3x - 3z + 2 \\ 9z + x + y = 6 + xz + yz \end{cases}$$

**Задание 6.**

Решите уравнение:

$$\sin^3 x + \frac{1}{2} \sin 2x - 2 \sin x - \sin x \sin 2x - 2 \cos^2 x + 4 \cos x = 0.$$

**Задание 7.**

Решите неравенство:

$$\log_{x-3} |x - 4| < 2.$$

**Задание 8.**

На какое наибольшее число частей могут разделить плоскость 6 прямых, если прямые не проходят через одну точку и любые две не параллельны. Ответ обоснуйте.

Утверждаю:

Председатель методической  
комиссии по профилю

«Математика»

 В.Н. Деснянский

«28» ноября 2022 г.

**ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА  
ШКОЛЬНИКОВ «ПАРУСА НАДЕЖДЫ»  
ПО ПРОФИЛЮ «МАТЕМАТИКА»  
2022-2023 УЧ. ГОД  
Заключительный этап  
11 класс**

**Вариант 2**

**Задание 1.**

Велосипедист проезжает 1 км при попутном ветре за 3 минуты, а при движении против того же ветра – за 5 минут. За сколько минут он проезжает 1 км в безветренную погоду?

**Задание 2.**

Разложите на множители выражение:

$$(x+y+z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$$

**Задание 3.**

Известно, что уравнение  $x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx + 1 = 0$  имеет четыре положительных корня.

Найдите числа  $a$  и  $b$ .

**Задание 4.**

Сравните два числа:

$$\sqrt{15 + \sqrt{60} + \sqrt{84} + \sqrt{140}} \text{ и } 6,5.$$

Ответ обоснуйте.



**Задание 5.**

Решите в целых числах систему:

$$\begin{cases} x^2 + yz - yx - zx = 3z - 3x + 2 \\ 9x + z + y = 6 + xz + yx \end{cases}$$

**Задание 6.**

Решите тригонометрическое уравнение:

$$\cos^2 x + \frac{1}{2} \sin 2x \sin x - 2 \cos x - 4 \sin^3 x - 2 \sin 2x + 8 \sin x = 0$$

**Задание 7.**

Решите неравенство:

$$\log_{|1-2x|}(3-x) \geq 1$$


**Задание 8.**

На какое наибольшее число частей могут разделить плоскость 4 прямые?  
Ответ обоснуйте.

Утверждаю:

Председатель методической  
комиссии по профилю

«Математика»

 В.Н. Деснянский  
«28» ноября 2022 г.

**ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА  
ШКОЛЬНИКОВ «ПАРУСА НАДЕЖДЫ»  
ПО ПРОФИЛЮ «МАТЕМАТИКА»  
2022-2023 УЧ. ГОД  
Заключительный этап  
11 класс**

**Вариант 3**

**Задание 1.**

На дороге в гору, соединяющую два селения, нет горизонтальных участков дороги. Автобус в гору всегда идет со скоростью 30 км/ч, а с горы – 60 км/ч. На проезд туда и обратно автобус тратит 2 часа (не считая остановок).

Найдите длину пути между селениями.

**Задание 2.**

Представьте в виде произведения множителей выражение:

$$x^2 - y^2 - x + 3y - 2$$

**Задание 3.**

Известно, что уравнение  $x^6 - 6x^5 + 15x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$   
- имеет шесть действительных корней.

Найдите числа  $a, b, c, d$ .

**Задание 4.**

Сравните два числа:

$$\sqrt{15 + \sqrt{48} + \sqrt{56} + \sqrt{168}} \text{ и } 6,40.$$

Ответ обоснуйте.

**Задание 5.**

Решите в целых числах систему:

$$\begin{cases} y^2 + zx - zy - yx = 3x - 3y + 5 \\ 2y - 3 = yx - yz - 2x + 2z \end{cases}$$

**Задание 6.**

Решите тригонометрическое уравнение:

$$\sin 2x \cos^2 x - \sin x \sin 2x + 2 \cos x \sin 2x - 4 \sin 2x - 2 \cos^3 x + \\ + 2 \cos x \sin x - 4 \cos^2 x + 8 \cos x = 0$$

**Задание 7.**

Решите неравенство:

$$\log_{1-x}(2x - 1) \geq 1$$

**Задание 8.**

На какое наибольшее число частей могут разбить плоскость 5 прямых, если никакие две прямые не параллельны.

Ответ обоснуйте.

**ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)**  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА**  
**ШКОЛЬНИКОВ «ПАРУСА НАДЕЖДЫ»**  
**ПО ПРОФИЛЮ «МАТЕМАТИКА»**  
**2022-2023 УЧ. ГОД**

**Краткие решения к заданиям очного тура**

**11 класс**

**Вариант 1**

**Задание 1.**

Пусть  $U_1$  – скорость первого всадника (из А),  $U_2$  – скорость второго всадника (из В). Пусть до встречи со вторым всадником 1 проедет путь  $-S_1$ , второй путь –  $S_2$ . Тогда по условиям задачи

$$\frac{S_2}{U_1} = 27 \text{ минут}, \frac{S_1}{U_2} = 12 \text{ минут}, S_2 = 27U_1, S_1 = 12U_2.$$

Также:  $\frac{S_1}{U_1} = \frac{S_2}{U_2}$ . Поэтому  $\frac{12U_2}{U_1} = \frac{27U_1}{U_2} \Rightarrow 4 \frac{U_2}{U_1} = 9 \frac{U_1}{U_2}$ ,

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{3}{2}. \text{ Отсюда находим, что } \frac{12U_2+27U_1}{U_2} = 12 + 27 * \frac{2}{3} = 30 \text{ минут, а}$$

тогда  $\frac{12U_2+27U_1}{U_1} = 12 \frac{U_2}{U_1} + 27 = 27 + 18 = 45 \text{ минут.}$

Ответ: 30 минут и 45 минут

**Задание 2.**

Ответ:  $x^5 + x + 1 = (x^2 + x + 1)(x^3 - x^2 + 1)$

**Задание 3.**

Пусть  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$  корни уравнения. По теореме Виета  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 5$ ,  $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 \cdot x_5 = 1$ . Из неравенства о среднем геометрическом и среднем арифметическом следует, что  $1^5 = \sqrt{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 \cdot x_5} \leq \leq \frac{x_1+x_2+x_3+x_4+x_5}{5} = 1$ . А тогда из равенства средних получим, что

все корни равны  $1^5$ , поэтому  $x^5 - 5x^4 + ax^3 + vx^2 + cx - 1 = (x - 1)^5$ .

Отсюда по формуле бинома Ньютона находим ответ:  $a=10$ ;  $v= - 10$ ;  $c=5$

**Задание 4.**

$$\begin{aligned}\sqrt{10 + 2\sqrt{6} + 2\sqrt{10} + 2\sqrt{15}} &= \sqrt{2 + 3 + 5 + 2\sqrt{2 \cdot 3} + 2\sqrt{2 \cdot 5} + 2\sqrt{3 \cdot 5}} = \\ &= \sqrt{(\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5})^2} = \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}. \text{ Так как}\end{aligned}$$

$$\sqrt{2} < 1,42; \sqrt{3} < 1,74; \sqrt{5} < 2,24, \text{ то}$$

$\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5} < 1,42 + 1,74 + 2,24 = 5,4$ . Следовательно число слева меньше числа справа.

Ответ: первое число (радикал) меньше второго.

**Задание 5.**

Группируя слагаемые, систему можно представить в виде: 
$$\begin{cases} y - z - \frac{2}{x-z} = 3 \\ y + x - \frac{3}{z-1} = 9 \end{cases}$$

Так как по условию  $x; y; z$  – целые числа, то из второго уравнения следует, что  $z \in \{0, -2, 2, 4\}$ . Вычитаем из второго уравнения первое уравнение, получим:

$$x + z - \frac{3}{z-1} + \frac{2}{x-z} = 6. \text{ Будем подставлять в это уравнение возможные}$$

значения  $z$ . При  $z = 0$   $x^2 - 3x + 2 = 0$ , значит либо  $x = 1$ , либо  $x = 2$ .

Отсюда при  $x = 1$   $y = 5$ , при  $x = 2$   $y = 4$ . Для других значений  $z$  система не будет иметь целых решений.

Ответ: (1;5;0), (2;4;0)



**Задание 6.**

Обозначим  $\sin x = a$   $\cos x = b$ , тогда:  $a^3 + ab - 2a - 2a^2b + 4b = 0$ .

Группируя слагаемые, получим  $a^2(a - 2b) + a(b - 2) + 2b(2 - b) = 0$ .

Отсюда  $a^2(a - 2b) + (b - 2)(a - 2b) = 0, (a - 2b)(a^2 + b - 2) = 0$ .

Следовательно,  $(\sin x - 2 \cos x)(\sin^2 x \cos x - 2) = 0$ . Из уравнения  $\sin x - 2 \cos x = 0$  получим  $\operatorname{tg} x = 2, x = \operatorname{arctg} 2 + k\pi, k \in Z$ . Второе уравнение очевидно не имеет решений по свойству  $\sin x$  и  $\cos x$ . Равенство  $\sin^2 x = \cos x = 1$  невозможно.

Ответ:  $\{ \operatorname{arctg} 2 + k\pi \quad k \in Z \}$

**Задание 7.**

ОДЗ:  $x > 3, x \neq 4$ .

Имеем:  $\log_{x-3}|x-4| < \log_{x-3}(x-3)^2$ . Тогда возможны два случая:

$$\begin{cases} x - 4 < x^2 - 6x + 9 \\ x > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 7x + 13 > 0 \\ x > 4 \end{cases} \gg x > 4$$

$$\begin{cases} x < 4 \\ x - 4 > x^2 - 6x + 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 4 \\ x^2 - 5x + 5 > 0 \end{cases} \gg x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2} \text{ с учетом ОДЗ}$$

получим ответ:  $(x > 4) \cup (3; \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2})$

**Задание 8.**

Легко увидеть, что три прямые разбивают плоскость на 7 частей. Тогда 4 прямые могут разбить плоскость на 11 частей, так как четвертая прямая пересекает три данные прямые, делится точками пересечения на 4 части (каждая часть прямой разбивает каждую часть плоскости, через которую проходит (таких частей 4) еще на 2 части). Следовательно, число частей плоскости увеличится на 4, и будет  $7 + 4 = 11$  частей.

Аналогично находим, что число  $m_5$  частей, на которые могут разделить плоскость пять прямых, будет равно:  $m_5 = m_4 + 5 = 16$ , где  $m_4$  – число разбиений плоскости 4 прямыми. Аналогично находим, что  $m_6 = m_5 + 6 = 22$ .

Ответ:  $\{22\}$

**ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)**  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА**  
**ШКОЛЬНИКОВ «ПАРУСА НАДЕЖДЫ»**  
**ПО ПРОФИЛЮ «МАТЕМАТИКА»**  
**2022-2023 УЧ. ГОД**

**Краткие решения к заданиям очного тура**  
**11 класс**

**Вариант 2**

**Задание 1.**

Скорость велосипедиста при попутном ветре, согласно условию задачи, равна  $\frac{1}{3}$  км/мин., при встречном ветре  $\frac{1}{5}$  км/мин.. тогда собственная скорость велосипедиста равна полусумме двух указанных скоростей, а именно  $\frac{1}{2}(\frac{1}{3} + \frac{1}{5}) = \frac{4}{15} = \frac{1}{3\frac{3}{4}}$  км/мин. Отсюда получаем, что велосипедист в безветренную погоду проезжает 1 км за 3 минуты 45 секунд.

Ответ: 3 минуты 45 секунд.

**Задание 2.**

$$\begin{aligned} (x+y+z)^3 - x^3 - y^3 - z^3 &= x^3 + 3x^2(y+z) + 3x(y+z)^2 + \\ &+ (y+z)^3 - x^3 - y^3 - z^3 = 3x^2(y+z) + 3x(y+z)^2 + (y+z)^3 - y^3 - z^3 = \\ &= 3x^2y + 3x^2z + 3xy^2 + 6xyz + 3xz^2 + y^3 + 3zy^2 + \\ &+ 3yz^2 + z^3 - y^3 - z^3 = 3(x^2(y+z) + xy^2 + yxz + xz(y+z) + y + \\ &+ z(y+z)) = 3(y+z)(x^2 + xy + xz + yz) = 3(y+z)(x(x+y) + z(x+y)) = \\ &= 3(y+z)(x+y)(x+z) \end{aligned}$$

Ответ:  $3(y+z)(x+y)(x+z)$

**Задание 3.**

По теореме Виета  $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4$ ,  $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 = 1$ , где  $x_j$  – корни  $i = 1, \dots, 4$ . Из неравенства о среднем геометрическом и

среднем арифметическим имеем:  $1 = \sqrt{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4} \leq$

$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} \leq 1$ . Из равенства средних следует, что все корни этого уравнения равны 1. А тогда  $x^4 - 4x^3 + ax^2 + bx + 1 = (x - 1)^4 \Rightarrow$   
 $a = 6, b = -4$

Ответ:  $a = 6, b = -4$

#### Задание 4.

$$\begin{aligned} \sqrt{15 + \sqrt{60} + \sqrt{84} + \sqrt{140}} &= \sqrt{3 + 2\sqrt{15} + 2\sqrt{21} + 5 + 7 + 2\sqrt{35}} = \\ &= \sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7})^2} = \sqrt{3} + \sqrt{5} + \sqrt{7}, \text{ так как } \sqrt{3} > 1,70, \sqrt{5} > 2,20, \\ &\sqrt{7} > 2,60, \text{ а } 1,70 + 2,20 + 2,60 = 6,50, \text{ то число слева (радикал)} \end{aligned}$$

больше числа справа.

Ответ: первое число больше.

#### Задание 5.

Группируя слагаемые, систему можно записать в виде:

$$\begin{cases} x - y + 3 = \frac{2}{x-z} \\ \frac{3x-2}{x-1} = \frac{z+y}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - y + 3 = \frac{2}{x-z} \\ 3 + \frac{1}{x-1} = \frac{z+y}{3} \end{cases}. \text{ Так как } x, y, z \text{ целые числа,}$$

то из второго уравнения следует, что  $x = 0$  или  $x = 2$ . При  $x = 0$

имеем:  $\begin{cases} 3 - y = -\frac{2}{z} \\ z + y = 6 \end{cases}$  Складывая эти уравнения, получим  $z = 1, z = 2,$

при  $z = 1$   $y = 5$ , при  $z = 2$   $y = 4$ . При  $x = 2$  имеем  $z^2 + 9z + 16 = 0 \Rightarrow$   
целых корней нет.

Ответ:  $(0;4;2), (0;5;1)$

#### Задание 6.

Пусть  $\sin x = a$   $\cos x = b$ , тогда  $b^2 + a^2b - 2b - 4a^3 - 4ab + 8a = 0$ .

Группируя слагаемые, получим:  $b(a^2 + b - 2) - 4a(a^2 + b - 2) = 0$ . А тогда  
 $(\sin^2 x + \cos x - 2)(\cos x - 4\sin x) = 0$ . Отсюда:  $\sin^2 x + \cos x - 2 = 0$  или

$\cos x - 4\sin x = 0$ . Первое уравнение решений не имеет, так как равенства:  $\sin^2 x = 1$ ,  $\cos x = 1$  одновременно невозможны, поэтому  $4\sin x = \cos x \Rightarrow$

$$\Rightarrow \operatorname{tg} x = \frac{1}{4}, x = \operatorname{arctg} \frac{1}{4} + \pi k$$

Ответ:  $\{ \operatorname{arctg} \frac{1}{4} + \pi k \quad k \in Z \}$

### Задание 7.

ОДЗ  $x \neq 0, x \neq \frac{1}{2}, x < 3$ . Далее запишем,

$$\log_{|1-2x|}(3-x) \geq \log_{|1-2x|}|1-2x|$$

Здесь возможны два случая: 1)  $\begin{cases} |1-2x| > 1 \\ 3-x \geq |1-2x| \end{cases} \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x < 0 \\ x > 1 \\ (3-x)^2 \geq (1-2x)^2 \\ x \leq 4/3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < 0 \\ x > 1 \\ 3x^2 + 2x - 8 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow |-2 \leq x < 0|; 1 < x \leq 4/3.$$

Второй случай, когда  $|1-2x| < 1$ .

Тогда получаем:  $\begin{cases} -1 < 1-2x < 1 \\ 3x^2 + 2x - 8 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < x < 1 \\ x \leq -2; x > \frac{4}{3} \end{cases} \Rightarrow$  нет решений.

Ответ:  $[-2; 0) \cup (1; 4/3]$

### Задание 8.

Две непараллельные прямые разбивают плоскость на 4 части. Три прямые разбивают плоскость на 7 частей. Четвертая прямая, пересекая три данные прямые, делится точками пересечения на 4 части. Каждая часть прямой разбивает каждую часть плоскости, через которую проходит (таких частей имеется 4) еще на 2 части. Таким образом, число частей плоскости увеличивается на 4. Всего окажется  $7 + 4 = 11$  частей плоскости.

Ответ:  $\{11\}$



**ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)**  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ОЛИМПИАДА**  
**ШКОЛЬНИКОВ «ПАРУСА НАДЕЖДЫ»**  
**ПО ПРОФИЛЮ «МАТЕМАТИКА»**  
**2022-2023 УЧ. ГОД**

**Краткие решения к заданиям очного тура**  
**11 класс**

**Вариант 3**

**Задание 1.**

Пусть по пути в одну сторону автобус поднимается в гору на участках одного типа суммарной длины  $S_1$ , а спускается с горы на участках другого типа длины  $S_2$ . Тогда по пути в обратную сторону он будет, наоборот, спускаться с горы на участках первого типа и подниматься в гору на участках второго типа. Поэтому на проезд туда и обратно автобус затратит в общей сложности количество часов, равное  $\frac{S_1}{30} + \frac{S_2}{60} + \frac{S_1}{30} + \frac{S_2}{30} = (S_1 + S_2) \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{60}\right) = (S_1 + S_2) * \frac{1}{20} = 2$ . Т.е. длина пути  $S_1 + S_2$  между селениями равна 40 км.

Ответ: 40.

**Задание 2.**

Пусть  $x^2 - y^2 - x + 3y - 2 = (x + y + a)(x - y + b) = x^2 - y^2 + (a + b)x + ba$ . Отсюда  $a + b = -1, b - a = 3, ab = -2$ . Отсюда находим, что  $b = 1, a = -2$ . Таким образом,  $x^2 - y^2 - x + 3y - 2 = (x + y - 2)(x - y + 1)$ .

Ответ:  $(x + y - 2)(x - y + 1)$

**Задание 3.**

Если  $x_i (i = 1, \dots, 6)$  корни, то по т. Виета их сумма равна 6, а сумма  $x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_5x_6 = 15$ . Докажем, что если для чисел  $b_1, \dots, b_n$  сумма равна  $n$ , то сумма попарно различных произведений  $\leq \frac{n(n-1)}{2}$ , причем равенство достигается лишь тогда и только тогда, когда  $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 1$ . В самом деле, имеем  $2(b_1b_2 + \dots + b_{n-1}b_n) = (b_1 + \dots + b_n)^2 - (b_1^2 + \dots + b_n^2) = n^2 - (b_1^2 + \dots + b_n^2)$ , тогда по неравенству Коши  $(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)n \geq (b_1 +$

$+b_2 + \dots + b_n)^2$ . Отсюда имеем  $-(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \leq -\frac{1}{n}(b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2$ . Следовательно  $n^2 - (b_1^2 + \dots + b_n^2) \leq n^2 - \frac{1}{n}(b_1 + b_2 + \dots + b_n)^2 = n^2 - n = n(n-1)$ , т.е. утверждение верно. При  $n = 6$ ,  $\frac{n(n-1)}{2} = 15$ , значит все  $x_i = 1$ . А тогда:  $x^6 - 6x^5 + 15x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = (x-1)^6$ . Поэтому, раскрывая скобки по формуле Бинома Ньютона, получаем:  
 Ответ:  $a = -20, b = 15, c = -6, d = 1$ .

**Задание 4.**

$\sqrt{15 + 2\sqrt{12} + 2\sqrt{14} + 2\sqrt{42}} = \sqrt{2 + 6 + 7 + 2\sqrt{12} + 2\sqrt{14} + 2\sqrt{42}} = \sqrt{(\sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{7})^2} = \sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{7}$ . С другой стороны,  $\sqrt{2} > 1,40, \sqrt{6} > 2,40, \sqrt{7} > 2,60$ . Следовательно  $\sqrt{2} + \sqrt{6} + \sqrt{7} > 6,40$  поэтому первое число (слева) больше второго числа (справа).

Ответ: первое число больше.

**Задание 5.**

Преобразуя второе уравнение системы, получим:

$2y - 3 = (x - z)(y - 2)$ , отсюда  $2 + \frac{1}{y-2} = x - z$ . Так как  $y$  - целое, то  $y = 1$  и  $y = 3$ . При  $y = 1$  получим  $x = z + 1$ ; при  $y = 3$ ,  $x = z + 3$ . Рассмотрим первый случай. Подставляя  $y = 1, x = z + 1$  в первое уравнение системы, получим  $z^2 - 4z - 5 = 0$ .

Значит  $z_1 = -1, z_2 = 5$ . Поэтому  $x_1 = 0, x_2 = 8$ . Имеем два решения системы:  $(0, 1, -1)$  и  $(6, 1, 5)$ . Во втором случае при  $y = 3$  и  $x = z + 3$  получаем уравнение

$z^2 - 6z - 5 = 0$ . Это уравнение не имеет целых решений.

Ответ:  $(0, 1, -1)$  и  $(6, 1, 5)$ .

**Задание 6.**

Обозначим  $\sin x = a$ ,  $\cos x = b$ . Тогда получим уравнение:  $2ab^3 - 2a^2b + 4ab^2 - 8ab - 2b^3 + 2ab - 4b^2 + 8b = 0$ . Сокращая это уравнение на 2 и вынося за скобки общий множитель  $b$ , получим  $(ab^2 - a^2 + 2ab - 4a + a + 4 - b^2 - 2b)b = 0$ . А тогда имеем:  $(a(b^2 - a + 2b - 4) - (b^2 + 2b - a - 4))b = 0$ . Отсюда:  $b(b^2 + 2b - a - 4)(a - 1) = 0$ . Поэтому получаем:  $b = \cos x = 0$ ,  $a = \sin x = 1$  и  $\cos^2 x + 2 \cos x - \sin x - 4 = 0$ . Поэтому имеем:  $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m$ . Последнее равенство будет, если  $\cos 2x = 1, \sin x = -1$ , что невозможно.

Ответ:  $x = \frac{\pi}{2} + \pi k \quad k \in \mathbb{Z}$ .

**Задание 7.**

Находим ОДЗ  $1 - x > 0, 1 - x \neq 1, 2x - 1 > 0 \Rightarrow \frac{1}{2} < x < 1$ . Отсюда следует, что в области ОДЗ основание логарифма меньше единицы. Поэтому  $\log_{1-x}(2x - 1) \geq \log_{1-x}(1 - x) \Rightarrow 2x - 1 \leq 1 - x$ , т.е.  $x \leq \frac{2}{3}$ .

Ответ:  $\frac{1}{2} < x \leq \frac{2}{3}$ .

**Задание 8.**

Две непараллельные прямые разбивают плоскость на четыре части. Если добавить еще одну прямую, то нетрудно видеть, что число разбиений плоскости будет равно  $4 + 3 = 7$ . Если провести еще одну прямую, то эта четвертая, пересекая три данные прямые делится точками пересечения на 4 части и, следовательно, число частей плоскости увеличивается на 4. Всего окажется  $7 + 4 = 11$  частей плоскости. Теперь, если провести ещё одну прямую, то число разбиений плоскости  $m_5$  пятью прямыми будет равно:

$$m_5 = m_4 + 5 = 16.$$

Ответ: 16.